



La prevenzione dell'infezione da Coronavirus SARS-CoV-2

Guida pratica per Odontoiatri e
personale di studio odontoiatrico





Generalità sui Coronavirus SARS-CoV-2

Si trasmette principalmente a seguito di contatti stretti e prolungati da uomo a uomo. I sintomi principali sono febbre, tosse, difficoltà respiratorie, dolori muscolari e mal di gola.

È nota da solo poche settimane e le conoscenze scientifiche sulla sua evoluzione clinica sono in continuo aggiornamento.


Sarà nostra cura aggiornarVi costantemente sull'evolversi delle conoscenze e delle misure di prevenzione e di specifico intervento in particolari aree che saranno diramate dalle Istituzioni di riferimento.



Prevenzione dell'infezione da Coronavirus SARS-CoV-2

Metodiche di prevenzione più efficaci senza incorrere in inutili e anche pericolosi allarmismi.

- Includere nell'**anamnesi medica prossima** la richiesta di evidenziare recenti viaggi nelle aree già soggette a quarantena o di frequentazioni con persone provenienti da esse.
- **Ricambiare l'aria** sempre tra un paziente ed un altro e periodicamente anche in sala d'attesa.
- Utilizzare costantemente i **DPI (dispositivi di protezione individuali)** mentre si sta lavorando e pretendere massima attenzione nell'uso dei DPI da parte del personale medico e sanitario.
- **Lavarsi le mani** per almeno 20 secondi. L'operazione di lavaggio deve essere preliminare all'uso del disinfettante.
- Detergere le superfici di contatto clinico (**le superfici che si toccano più frequentemente come le bottoniere e le maniglie**) sempre tra ogni paziente e proteggerle con dispositivi da cambiare ogni volta tra i pazienti.
- Mettere a disposizione di pazienti e accompagnatori un **disinfettante alcolico** all'entrata e invitarli a **pulire le mani** prima di accomodarsi.



Commissione
Albo
Odontoiatri

